

Impfschema Pferdeklinik Salzhofen

| | Tetanus | Influenza | Herpes |
|-----------------------------|--|---|---|
| Grundimmunisierung | <p>Die erste Impfung im Alter von 6 Monaten</p> <p>Die zweite Impfung 4 bis 6 Wochen nach der ersten Impfung</p> <p>Die dritte Impfung 12 bis 14 Monate nach der zweiten Impfung</p> | <p>Die erste Impfung ab dem 6. Monat</p> <p>Die zweite Impfung 4 bis 6 Wochen nach der ersten Impfung</p> <p>Die dritte Impfung 5 bis 6 Monate nach der zweiten Impfung</p> | <p>Die erste Impfung ab dem 6. Monat</p> <p>Die zweite Impfung 4 bis 6 Wochen nach der ersten Impfung</p> <p>Die dritte Impfung 5 bis 6 Monate nach der zweiten Impfung</p> |
| Auffrischungsimpfung | <p>Wiederholungsimpfungen im Abstand von 2-3 Jahren, je nach Impfstoff empfohlen</p> | <p>Wiederholungsimpfung im Abstand von 12 Monaten, bei Turnierpferden im Abstand von 6 Monaten</p> | <p>Wiederholungsimpfungen im Abstand von 6 Monaten empfohlen</p> |

Herpes Impfung tragende Stute:

Lebendvaccine: 4. bis 5. und 8. Trächtigsmonat

Inaktivierte Vaccine: 5. und 7. und 9. Trächtigsmonat